

Gatunek	Kiedy pobieramy?	Co pobieramy?	Ile pobieramy?
Żyto	Przed zawiązaniem kłosa.	4 szczytowe liście.	4 szczytowe liście z 30-50 roślin.
Owies	Przed zawiązaniem kłosa.	4 szczytowe liście.	4 szczytowe liście z 30-50 roślin.
Jęczmień	Przed zawiązaniem kłosa.	4 szczytowe liście.	4 szczytowe liście z 30-50 roślin.
Pszenica	Przed zawiązaniem kłosa.	4 szczytowe liście.	4 szczytowe liście z 30-50 roślin.
Kukurydza	Wiązanie kolb / kwitnienie.	Pierwszy w pełni wykształcony liść w obrębie rośliny.	1 pierwszy w pełni wykształcony liść z 15-20 roślin.
Lucerna	W fazie pąków do kwitnienia (maksymalnie 10% kwiatów).	30% górnej części rośliny (fragment łodygi i cały liść, bez korzeni).	1/3 górnej części rośliny z 30-40 roślin.
Rzepak	W trakcie kwitnienia.	Cała nadziemna część rośliny. Niezanieczyszczona glebą.	20-30 roślin na jedną próbę.
Burak cukrowy	W środku wzrostu rośliny.	W pełni rozwinięte liście ze środkowej części rośliny. Usuwamy ogonki liściowe.	Po jednym liściu z 30-40 roślin.
Tytoń	Przed kwitnieniem.	Czwarty liść licząc od góry.	Czwarty liść licząc od góry z 15 roślin.
Konopie	W środku wzrostu rośliny.	Najmłodszy, w pełni wyrosnięty liść.	30-50 liści, maksymalnie 2 liście z 1 rośliny.